

# Памятка для пациента на терапии лекарственным препаратом атезолизумаб



**Как использование любого лекарства, применение препарата атезолизумаб может вызывать серьезные побочные эффекты со стороны разных систем органов, которые требуют немедленной терапии, но это происходит не у всех пациентов**

- Симптомы могут проявиться в любое время во время терапии, а также после окончания терапии.
- Немедленно свяжитесь со своим лечащим врачом, если у вас проявляются любые из перечисленных в данной памятке признаки и симптомы, или если ваши симптомы ухудшаются.
- Не пытайтесь лечить симптомы самостоятельно.
- Также сообщите лечащему врачу, если у вас наблюдаются любые другие симптомы, не перечисленные в данной памятке.
- Данная памятка должна находиться с вами постоянно, особенно во время путешествий, визитов к другим специалистам или в отделении экстренной медицинской помощи.
- Если у вас наблюдаются любые признаки и симптомы, не указанные в данной памятке, свяжитесь с лечащим врачом немедленно.
- Не рекомендуется принимать никакие другие препараты во время терапии без консультации с лечащим врачом.
- Своевременное получение медицинской помощи может остановить развитие нежелательной реакции.
- Если у вас есть вопросы, касающиеся терапии или применения данного препарата, пожалуйста, свяжитесь с лечащим врачом.



**Серьезные побочные эффекты могут привести к появлению следующих признаков и симптомов**

- **Со стороны легких:** появившийся или усиливающийся кашель, затрудненное дыхание, боль в груди
- **Со стороны печени:** пожелтение кожи или белков глаз, тошнота или рвота, кровотечения или появление кровоподтеков, темная моча, боль в животе
- **Со стороны кишечника:** диарея (водянистый, жидкий или мягкий стул), кровь в стуле, боль в животе
- **Со стороны желез внутренней секреции:** усталость, головные боли, потеря веса, набор веса, перемены настроения, потеря волос, запоры, головокружения, чувство голода или жажды больше обычного, более частые позывы к мочеиспусканию, изменения зрения, повышенная чувствительность к холоду или теплу
- **Со стороны сердца:** боль в груди, затрудненное дыхание, неровное сердцебиение, усталость, обмороки, снижение толерантности к нагрузкам, отек голеностопного сустава
- **Со стороны ЦНС:** ригидность затылочных мышц, головные боли, лихорадка, озноб, рвота, чувствительность глаз к свету, дезориентация, сонливость
- **Со стороны мышц и скелета:** воспаление или повреждение мышц, мышечная боль и слабость
- **Со стороны нервной системы:** слабость мышц и онемение, покалывание в кистях и стопах
- **Со стороны поджелудочной железы:** боль в животе, тошнота, рвота
- **Со стороны почек:** изменения диуреза и цвета мочи, боль в тазу, отеки

**Реакции, связанные с введением препарата** (в день инфузии или в течение одного дня после проведения инфузии): лихорадка, озноб, затрудненное дыхание, приливы жара к лицу

*Своевременное получение медицинской помощи в отношении указанных выше симптомов может предотвратить развитие серьезных последствий. Ваш врач может назначить вам другие препараты для предотвращения осложнений и уменьшения симптомов, а также может приостановить введение следующей дозы атезолизумаба или отменить терапию*



**НОСИТЕ ЭТУ ПАМЯТКУ С СОБОЙ ПОСТОЯННО!**

**Пожалуйста, показывайте эту памятку всем медицинским специалистам (включая медсестер, фармацевтов и стоматологов), во время всех визитов в больницу**



ФИО пациента

Телефон для связи с врачом

Дополнительная информация

ФИО врача

Дата следующего приема (введения)

