

Диагностический каскад PD-L1 экспрессии и аббераций в гене FGFR при метастатическом и местнораспространенном уротелиальном раке

Проведите тестирование на PD-L1 экспрессию и абберации в генах FGFR: это поможет выбрать оптимальное терапевтическое решение для каждого пациента

Алгоритм тестирования



- Существует **возможность бесплатного тестирования** в рамках национальной программы RUSSCO
- При возникновении вопросов звоните на горячую линию: **8-800-600-36-76**

Официальный сайт Программы RUSSCO. Совершенствование молекулярно-генетической диагностики в Российской Федерации с целью повышения эффективности противоопухолевого лечения. Интернет-источник. Режим доступа: www.cancergenome.ru (Дата обращения: 07.02.2022). Ассоциация онкологов России. Клинические рекомендации по диагностике и лечению больных раком мочевого пузыря. Интернет-источник. Режим доступа: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/11_2 (дата обращения: 23.07.2021).

ПРИ УРОТЕЛИАЛЬНОМ РАКЕ

программа RUSSCO позволяет
бесплатно определить
следующие маркеры:



PD-L1 экспрессия для 1-й линии терапии пациентов с местнораспространенным или метастатическим уротелиальным раком, не подходящих для терапии цисплатином*, и



Аберрации в генах FGFR у пациентов с метастатическим и местнораспространенным уротелиальным раком для 2-й и последующих линии таргетной терапии**

*Коды не требуются. В рамках программы используется тест VENTANA PD-L1 (SP142).

** Коды не требуются. Для выявления нарушений в генах FGFR используется метод ПЦР.

При возникновении вопросов обращайтесь по телефону
горячей линии: **8-800-600-36-70**

Информация предназначена для медицинских работников

M-RU-00006174 февраль 2022

АО «Рош-Москва»
107031, Россия, г. Москва
Трубная площадь, дом 2
Помещение I, этаж 1, комната 42
МФК «Галерея Неглинная»
Тел.: +7 (495) 229-29-99
www.roche.ru

