РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ AB-REAL

Данные по безопасности и эффективности применения атезолизумаба в комбинации с бевацизумабом при неоперабельной гепатоцеллюлярной карциноме в условиях реальной клинической практики



Отсканируйте QR-код,
чтобы ознакомиться с публикацией
по исследованию

A **AB-REAL:** медиана ОВ: 15,74 месяца; 95% ДИ: 14,5–NE[1]

Медиана длительности наблюдения: 10,0 месяцев



B **IMbrave150:** обновленный анализ ОВ[2]

Медиана длительности наблюдения: 15,6 месяца



C **AB-REAL:** медиана ВБП: 6,91 месяца; 95% ДИ: 6,1–8,3[1]



NE (Non-Established) – не установлено

D **IMbrave150:** обновленный анализ ВБП[c,2]



[a] Со стратификацией. [b] Приведено в описательных целях. [c] По результатам независимой оценки с использованием критериев RECIST 1.1

Несмотря на то, что проведение любого ретроспективного исследования осложняется неполнотой собранных данных и недостатком стандартизации при первичной оценке испытуемых, **данное исследование продемонстрировало, что профили эффективности и безопасности атезолизумаба и бевацизумаба при использовании в реальной клинической практике сопоставимы с аналогичными профилями, полученными в исследовании 3-й фазы IMbrave150.**[1]

- AB-REAL – это первое международное ретроспективное исследование, проводившееся с целью продемонстрировать воспроизводимость результатов применения атезолизумаба в комбинации с бевацизумабом при неоперабельной ГЦК в реальной клинической практике[1]
- По результатам статистического анализа медиана ОВ в когортах пациентов, получавших эту комбинацию препаратов в условиях реальной клинической практики и в рамках исследования 3-й фазы, была схожей[1]
- Медиана ВБП среди пациентов, получавших эту комбинацию препаратов в рамках исследования 3-й фазы, не отличалась от аналогичного показателя у пациентов, получавших комбинированную терапию в условиях реальной клинической практики[1]
- ЧОО: 30,8%; ПРПО: 2,9%; ЧО: 27,8%; СЗ: 46,9%; ЧКЗ: 77,7%; ППЗ: 22,3%; мДО: 12,4 месяца[1]
- Сообщений о новых нежелательных явлениях не поступало[1]

Аббревиатуры

Атезо	Атезолизумаб	мДО	Медиана длительности ответа
Бева	Бевацизумаб	ЧОО	Частота объективного ответа
ДИ	Доверительный интервал	ОВ	Общая выживаемость
ПРПО	Полный рентгенографически подтвержденный ответ на лечение	ВБП	Выживаемость без прогрессирования
ЧКЗ	Частота контроля заболевания	ППЗ	Первичное прогрессирование заболевания
ГЦК	Гепатоцеллюлярная карцинома	ЧО	Частичный ответ
ОР	Отношение рисков	СЗ	Стабилизация заболевания

Примечания

1. Fulgenzi et al. Reproducible safety and efficacy of atezolizumab plus bevacizumab for HCC in clinical practice: Results of the AB-real study. European Journal of Cancer. 2022; 175: 204–213. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejca.2022.08.024.
2. Cheng AL et al. Updated efficacy and safety data from IMbrave150: Atezolizumab plus bevacizumab vs. sorafenib for unresectable hepatocellular carcinoma. J. Hepatol. 2022; 76: 862–873. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.11.030.

Информация о препаратах

Чтобы ознакомиться с медицинской информацией по препарату атезолизумаб, **отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке https://www.roche.ru/ru/produkty/katalog/tecentriq.html**

Чтобы ознакомиться с медицинской информацией по препарату бевацизумаб, **отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке https://www.roche.ru/ru/produkty/katalog/avastin.html**

Если Вам требуется **распечатанная актуальная инструкция**, свяжитесь с нами по телефону **+7 (495) 229-29-99**, и мы пришлем инструкцию по указанному Вами адресу.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
M-RU-00010401 март 2024

АО «Рош-Москва»
107031, Россия, г. Москва
Трубная площадь, дом 2
Помещение I, этаж 1, комната 42
МФК «Галерея Неглинная»
Тел. +7 (495) 229-29-99
www.roche.ru