

ТЕЦЕНТРИК® – первый онкоиммунологический препарат для терапии уротелиального рака^{1,2}

**Стадии рака мочевого
пузыря по TNM**

**Местнораспространенная
и метастатическая стадии**

**Критерии определения
прогрессирования заболевания –
основное отличие irRC**

**Список сокращений,
литература**

Стадии рака мочевого пузыря по TNM³



Указывается размер первичной опухоли (**Tumour**) и степени ее распространения в прилегающие области



Указывается степень распространения раковой опухоли на прилегающие лимфатические узлы (**Nodes**)



Указывается наличие и количество отдаленных метастазов (**Metastasis**)

Местнораспространенная и метастатическая стадии^{4,5}

Стадия 0a	Ta	N0	M0
Стадия 0is	Tis	N0	M0
Стадия I	T1	N0	M0
Стадия II	T2a, b	N0	M0
Стадия IIIA	T3a, b, T4a	N0	M0
	T1–T4a	N1	M0
Стадия IIIB	T1–T4a	N2, N3	M0
Стадия IVA	T4b	N0	M0
	любое T	любое N	M1a
Стадия IVB	любое T	любое N	M1b

Критерии определения прогрессирования заболевания – основное отличие irRC³

	RECIST v1.1	irRC
Полный ответ (ПО)	Резорбция всех целевых и нецелевых очагов; уменьшение поперечного размера лимфатических узлов до <10мм; нет новых очагов; требует подтверждения	Одинаково с RECIST
Целевые очаги	Не более 5	Не более 25
Новые очаги	В результате прогрессирования заболевания при первичной оценке	До 10 новых висцеральных и до 5 новых подкожных очагов могут быть добавлены к сумме 2х наибольших перпендикуляров всех очагов в любой момент времени
Частичный ответ (ЧО)	≥30% уменьшение суммы диаметров целевых очагов по сравнению с исходными значениями; требует подтверждения	≥50% уменьшение опухолевой нагрузки по сравнению с исходными значениями; требует подтверждения
Прогрессирование заболевания (ПЗ)	≥20% увеличение суммы диаметров целевых очагов и/или прогрессирование нецелевых очагов и/или появление новых очагов (в любой момент времени)	≥25% увеличение опухолевой нагрузки по сравнению с предварительной оценкой; новые очаги; требует подтверждения в динамике
Стабилизация заболевания (СЗ)	Любые признаки ответа, которые не соответствуют критериям ПО, ЧО или ПЗ	Одинаково с RECIST

Список сокращений

IRRECIST – (Immune-related response evaluation criteria in solid tumors)

критерии оценки ответа солидных опухолей на иммунотерапию;

IRRC – (immune-related response criteria) критерии оценки ответа на иммунотерапию;


ПО – полный ответ;

ЧО – частичный ответ;

ПЗ – прогрессирование заболевания.

Список литературы

1. В России зарегистрирован иммунотерапевтический препарат Тецентрик® (атезолизумаб) – первый PD-L1 ингибитор для терапии рака мочевого пузыря (<https://www.roche.ru/ru/media/novosti/news-2018-02-09.html>); 2. Онкоиммунологический препарат Тецентрик® зарегистрирован для терапии рака мочевого пузыря 18 января 2018, РУ No ЛП-004652 по данным Государственного реестра лекарственных средств. 3. Eisenhauer EA, et al. Clin Cancer Res 2009;15:7412-20. 4. TNM Classification of Malignant Tumour, 8-е издание. 5. American Cancer Society 2019: Bladder Cancer TNM classification.



Чтобы ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата ТЕЦЕНТРИК®, отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке:

<https://www.roche.ru/ru/produkty/katalog/tecentriq.html>

Если Вам требуется распечатанная актуальная инструкция, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 229 29 99, и мы пришлём инструкцию по указанному Вами адресу.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ | M-RU-00003221 май 2021