ТЕЦЕНТРИК®
атезолизумаб
СОЗДАН ПОБЕЖДАТЬ*

ПЕРВЫЙ
онкоиммунологический препарат
для терапии уротелиального рака[1,2]

СТАДИИ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПО TNM[3]

T — Указывается размер первичной опухоли (Tumour) и степени ее распространения в прилегающие области

N — Указывается степень распространения раковой опухоли на прилегающие лимфатические узлы (Nodes)

M — Указывается степень метастазирования (Metastasise) рака в другие органы тела

Местнораспространенная и метастатическая стадии[4,5]

Стадия 0a	Ta	N0	M0
Стадия 0is	Tis	N0	M0
Стадия I	T1	N0	M0
Стадия II	T2a, b	N0	M0
Стадия IIIA	T3a, b, T4a	N0	M0
	T1–T4a	N1	M0
Стадия IIIB	T1–T4a	N2, N3	M0
Стадия IVA	T4b	N0	M0
	любое T	любое N	M1a
Стадия IVB	любое T	любое N	M1b

ТЕЦЕНТРИК®
атезолизумаб
СОЗДАН ПОБЕЖДАТЬ*

Критерии определения прогрессирования заболевания – основное отличие irRC[3]

	RECIST v1.1	irRC
Полный ответ (ПО)	Резорбция всех целевых и нецелевых очагов; уменьшение поперечного размера лимфатических узлов до <10мм; нет новых очагов; требует подтверждения	Одинаково с RECIST
Целевые очаги	Не более 5	Не более 25
Новые очаги	В результате прогрессирования заболевания при первичной оценке	До 10 новых висцеральных и до 5 новых подкожных очагов могут быть добавлены к сумме 2х наибольших перпендикуляров всех очагов в любой момент времени
Частичный ответ (ЧО)	⩾30% уменьшение суммы диаметров целевых очагов по сравнению с исходными значениями; требует подтверждения	⩾50% уменьшение опухолевой нагрузки по сравнению с исходными значениями; требует подтверждения
Прогрес-сирование заболевания (ПЗ)	⩾20% увеличение суммы диаметров целевых очагов и/или прогрессирование нецелевых очагов и/или появление новых очагов (в любой момент времени)	⩾25% увеличение опухолевой нагрузки по сравнению с предварительной оценкой; новые очаги; требует подтверждения в динамике
Стабилизация заболевания (СЗ)	Любые признаки ответа, которые не соответствуют критериям ПО, ЧО или ПЗ	Одинаково с RECIST

*Атезолизумаб представляет собой гуманизированное моноклональное антитело, которое непосредственно связывается с PD-L1 и блокирует его взаимодействие с рецепторами PD-1 и B7.1. Атезолизумаб был разработан для исключения антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности. В КИ IMvigor210 монотерапия атезолизумабом привела к полному ответу у 13% в подгруппе пациентов с экспрессией PD-L1 ≥5% на иммунокомпетентных клетках в когорте 1, и у 7% в когорте 2 в общей популяции. Медиана длительности ответа в когорте 2 КИ IMvigor210 составила 24,8 месяца, а в когорте 1 медиана длительности ответа еще не достигнута. В КИ IMvigor130 комбинация атезолизумаба с платиносодержащей химиотерапией привела к объективному ответу у 47% пациентов с местнораспространенным и метастатическим уротелильным раком, увеличив частоту полных ответов до 13%, по сравнению с 7% в группе стандартной платиносодержащей терапии. Медиана длительности ответа в группе комбинированной иммунохимиотерапии составила 8,5 месяцев. Также в исследовании IMvigor130монотерапия атезолизумабом позволила достичь контроля над заболеванием у 66% пациентов с высокой экспрессией PD-L1. Медиана длительности ответа не достигнута.

1. В России зарегистрирован иммунотерапевтический препарат Тецентрик® (атезолизумаб) – первый PD-L1 ингибитор для терапии рака мочевого пузыря (https://www.roche.ru/ru/media/novosti/news-2018-02-09.html); 2. Онкоиммунологический препарат Тецентрик® зарегистрирован для терапии рака мочевого пузыря 18 января 2018, РУ No ЛП-004652 по данным Государственного реестра лекарственных средств. 3. Eisenhauer EA, et al. Clin Cancer Res 2009.15:7412-20. 4. TNM Classification of Malignant Tumour, 8-е издание. 5. American Cancer Society 2019: Bladder Cancer TNM classification.

IRRECIST – (Immunie-related response evalution criteria in solid tumors) критерии оценки ответа солидных опухолей на иммунотерапию; IRRC – (immune-related response criteria) критерии оценки ответа на иммунотерапию; ПО – полный ответ; ЧО – частичный ответ; ПЗ – прогрессирование заболевания.

Чтобы ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата ТЕЦЕНТРИК®, **отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:**
https://www.roche.ru/ru/produkty/katalog/tecentriq.html

Если Вам требуется **распечатанная актуальная инструкция**, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 229 29 99, и мы пришлём инструкцию по указанному Вами адресу.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ | M-RU-00001926 ДЕКАБРЬ 2020

АО «Рош-Москва»
107045, Россия, г. Москва
Трубная площадь, дом 2
Помещение I, этаж 1, комната 42
МФК «Галерея Неглинная»
Тел.: +7 (495) 229-29-99
www.roche.ru

Roche